

ДОТ



Універсальний фунгіцид з відмінною захисною та лікувальною дією

Переваги

- Відмінно проникає в рослину та швидко діє на збудників хвороб.
- Забезпечує тривалий захист.
- Широкий спектр хвороб, що контролюються.

Характеристики

Вміст діючої речовини ципроконазол 80 г/л + пропіконазол 250 г/л

Хімічна група триазоли

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ III клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або при появі перших ознак хвороб. Обробку доцільно проводити при температурі в межах +10°C - +25°C.

Сумісність

Сумісний з більшістю пестицидів, що застосовуються на сільськогосподарських культурах. Проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти продукти на сумісність.

Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 8

Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.

Механізм дії

Ципроконазол зупиняє розвиток грибів, блокуючи біосинтез стиролів у мембранах клітини, рухається акропетально. Пропіконазол рухається трансламінарно та має швидкий «стоп-ефект».

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Озима пшениця	Бура, стеблова та жовта іржа, борошниста роса, септоріоз листя і колосу, фузаріоз колосу, піренофороз	Обприскування в період вегетації	0,5	2
Ячмінь	Бура іржа, борошниста роса, плямистості листя		0,4-0,5	2
Цукрові буряки	Церкоспороз, борошниста роса		0,5	2
Соя	Септоріоз, біла гниль, іржа, борошниста роса		0,5	2
Соняшник	Борошниста роса, плямистості листя, іржа		0,5	2

Для розширення спектру дії на хвороби та підвищення захисного, викоринюючого та лікувального ефекту рекомендується використовувати бакову суміш ДОТ + Старк.

