



САЛЬТО



Системний фунгіцид профілактичної та лікувальної дії для захисту від комплексу збудників хвороб рослин

Переваги

- Має швидко і водночас подовжену захисну дію.
- Широкий спектр дії.
- Має лікувальну та викорінюючу дії.

Характеристики

- Вміст діючої речовини** тіофанат-метил, 500 г/л
- Хімічна група** бензімідазоли
- Препаративна форма** концентрат суспензії
- Класифікація ВООЗ** III клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Продукт застосовують шляхом обприскування культур для попередження появи захворювань або за наявності ознак ураження.

Сумісність

Гнучкий у змішуванні з іншими продуктами, окрім лужних. Не змішувати з мідьвмісними продуктами.

Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 7

Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину

Для польових культур 200-300 л/га, для плодових насаджень 1000-1200 л/га, виноградників 800-1000 л/га

Механізм дії

Завдяки системній дії тіофанат-метил швидко розподіляється по рослині. Унікально поєднує профілактичну і лікувальну дії, має викорінюючий ефект.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Пшениця	Борошниста роса, септоріоз, бура іржа, фузаріозна і церкоспорельозна кореневі гнилі	Обприскування в період вегетації	1,2-1,4	2
Соняшник	Фомоз, фомопсис, вертицильоз, склеротиніоз (біла гниль)		1,2-1,4	2
Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса		0,8-1,2	3
Соя	Церкоспороз, іржа, борошниста роса		1,0-1,4	2
Капуста	Фузаріозне в'янення, фомоз, борошниста роса, сіра та біла гнилі		1,5-2,0	2
Яблуня	Парша, борошниста роса, моніліоз		1,2-1,6	3
Виноградники	Оїдіум, сіра гниль		1,0-1,5	3

Для розширення спектру хвороб та їх контролю рекомендуємо застосування бакової суміші фунгіцидів Сальто + Парацельс.

Таке поєднання двох діючих речовин з контактною лікувальною та системною діями дозволить локалізувати поширення хвороб на неуражені частини, захистити посіви у період відновлення вегетації та збереже листову поверхню до наступного фунгіцидного обробітку на початку виходу у трубку.

