



# ТАЛЕР



## Системний фунгіцид для захисту від комплексу збудників хвороб

### Переваги

- Добре виражений «стоп-ефект».
- Володіє захисною, викорінюючою та лікувальною діями.
- Відмінний контроль фузаріозу колосу.
- Проявляє ріст-регулюючу дію на ріпак.

### Характеристики

**Вміст діючої речовини** тебуконазол, 250 г/л

**Хімічна група** триазоли

**Препаративна форма** концентрат емульсії

**Класифікація ВООЗ** III клас

### Рекомендації щодо застосування

#### Особливості застосування

Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або при перших симптомах прояву інфекції. Обробку доцільно проводити за температури в межах +10°C - +25°C.

#### Сумісність

Сумісний з іншими продуктами. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

#### Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 9

#### Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

#### Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

### Механізм дії

Тебуконазол інгібує біосинтез ергостерону в клітинах гриба, що призводить до руйнації клітинних стінок патогена, зупинки росту міцелію та його швидкої загибелі.

### Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Пшениця	Бура листова іржа, септоріоз, фузаріоз та борошніста роса	Обприскування в період вегетації	0,5-1,0	2
Ріпак	Альтернаріоз, циліндроспоріоз		0,5-1,0	2
Ріпак	Інгібування росту листя		0,5-0,75	2
Соя	Фузаріоз, альтернаріоз, склеротініоз		0,5-1,0	2

Використання фунгіциду Талер підвищує зимостійкість та забезпечує стійкість проти вилягання, сприяє кращому формуванню бічних пагонів. Талер швидко проникає в рослину, за 1-2 години. При цьому зберігає свою ефективність протягом декількох тижнів.

