



ПІРАМІДА



Селективний системний гербіцид для контролю однорічних та багаторічних коренепаросткових дводольних бур'янів

Переваги

- Знищує як наземну частину, так і кореневу систему бур'янів
- Широкий спектр застосування
- Знищує проблемні бур'яни: осот, ромашка, гірчак (види), нетреба звичайна, паслін та інші

Характеристики

Вміст діючої речовини клопіралід, 300 г/л

Хімічна група похідні піридинкарбонової кислоти

Препаративна форма розчинний концентрат

Класифікація ВООЗ III клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Оптимальний результат та максимально швидка гербіцидна дія продукту досягається при застосуванні продукту на листках молодих бур'янів у активній фазі розвитку. Найсприятливіший період для використання продукту: температура від 10°C до 25°C.

Сумісність

Можливе використання в бакових сумішах

Вимоги до рН робочого розчину

від 4 до 8

Застереження у застосуванні

Не змішувати з фунгіцидами та регуляторами росту, які мають ретардантний ефект, а також з фосфорорганічними інсектицидами.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.

Механізм дії

Клопіралід проникає в рослину через надземну частину і частково з вологого ґрунту через кореневу систему. Клопіралід є синтетичною формою натуральних рослинних гормонів, які замінюють натуральні гормони рослин, блокуючи їх функції. Перенасичення синтетичними гормонами призводить до порушення ростових процесів та загибелі рослин

Клопіралід поглинається листям і корінням, транспортується по рослині та накопичується в меристемі, пригнічує дихання і ріст клітин. знищує як наземну, так і кореневу систему бур'янів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Бур'яки цукрові	Однорічні та багаторічні коренепаросткові дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 1-3 пари справжніх листків культури	0,3-0,5	1
Кукурудза	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4 Д та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування культури у фазі 3-5 листків	0,3-1,0	1
Ріпак	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування посівів у фазі 6-8 листків у однорічних бур'янів, у фазі розетки - початку формування генеративного пагону 2-8 см (проти осотів)	0,3-0,5	1
Пшениця	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4 Д та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування від фази куцання до виходу в трубку культури	0,3-0,5	1

Для знищення надземної частини та кореневої системи осоту (види) рекомендується застосування гербіциду Піраміда у фазі розвитку «розетки» (висота осоту 15-20 см).

