



# КАМЗОЛ ТУРБО



## Комбінований системний фунгіцид захисної та лікувальної дії

### Переваги

- Широкий спектр дії: пригнічує основні хвороби культур.
- Швидко проникає в рослину та забезпечує відмінну дію продукту.
- Широке вікно застосування.

### Характеристики

**Вміст діючої речовини** ципроконазол, 80 г/л + метконазол, 60 г/л

**Хімічна група** триазоли

**Препаративна форма** концентрат емульсії

**Класифікація ВООЗ** III клас

### Рекомендації щодо застосування

#### Особливості застосування

Обприскування слід проводити за температури повітря в межах від +10°C до +25°C та швидкості вітру не вище 3 м/сек при дрібнокрапельному і 4 м/сек при крупнокрапельному обприскуванні.

#### Сумісність

Продукт можна використовувати в бакових сумішах з більшістю пестицидів. Однак перед цим необхідно провести пробне змішування.

#### Вимоги до рН робочого розчину

Від 4 до 9

#### Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.

### Механізм дії

Ципроконазол зупиняє розвиток грибів, блокуючи біосинтез стеролів у мембранах клітини, рухається акропетально.

Механізм дії метконазолу базується на інгібуванні біосинтезу ергостерину, порушенні біосинтезу клітинних мембран гриба. Метконазол швидко проникає в рослину і розподіляється в ній акропетально.

### Норми витрат та строки застосування

| Культура, об'єкт, що обробляється | Спектр дії   | Фаза внесення                    | Норми витрати, л / га | Максимальна кількість обробок |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Пшениця                           | Фузаріоз, септоріоз, іржа, альтернаріоз, борошниста роса                                     | Обприскування в період вегетації | 0,5-0,7               | 2                             |
| Ячмінь озимий та ярий             | Фузаріоз, септоріоз, іржа, альтернаріоз, борошниста роса, сітчаста плямистість, ринхоспоріоз |                                  | 0,5-0,7               | 2                             |
| Ріпак                             | Фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз  |                                  | 0,5-0,7               | 2                             |
| Соняшник                          | Іржа, борошниста роса, альтернаріоз  |                                  | 0,5-0,7               | 2                             |
| Соя                               | Іржа, фузаріоз, септоріоз, борошниста роса, альтернаріоз, склеротиніоз                       |                                  | 0,5-0,7               | 2                             |

