



NEW

ШЕРИФ МАКСІ



0,2кг

Післясходовий системний гербіцид для контролю однорічних та деяких багаторічних дводольних бур'янів в т.ч. стійких до 2,4 Д

Переваги

- Контроль підмаренника чіпкого до 7 кілець, падалиці класичного соняшника та ріпаку.
- Широке вікно застосування.
- Придатний для осіннього застосування.

Характеристики

Вміст діючої речовини	трибенурон-метил, 563, г/кг + флорасулам, 187 г/кг
Хімічна група	сульфонілсечовини + тріазолпіримідіни
Препаративна форма	водорозчинні гранули
Класифікація ВООЗ	III клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обприскування краще проводити при температурі повітря не вище +25°C у вранішні (до 10) та вечірні (18-22) години за швидкості вітру не вище 3 м/сек при дрібнокрапельному і 4 м/сек при крупнокрапельному обприскуванні. Під час внесення робоча швидкість агрегату повинна становити 7-10 км/год.

Сумісність

Продукт сумісний з іншими препаратами. Рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Вимоги до рН робочого розчину

від 6 до 8

Застереження у застосуванні

Для запобігання пошкодження культур, не допускайте змішування цього препарату з інсектицидами, що містять фосфорорганічні сполуки. Також уникайте послідовного застосування цих препаратів та гербіцидів з інтервалом менше ніж 7 днів.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.

Механізм дії

Гербіцид має системну дію, поглинається переважно листям, а також коренями бур'янів. Потрапивши до рослини, діюча речовина переміщується до точки росту та уповільнює поділ клітин, зупиняючи ріст пагонів та коріння рослин бур'янів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, г / га	Максимальна кількість обробок
Пшениця озима	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4 Д та деякі багаторічні бур'яни	Обприскування у фазу від 2-х листків – до прапорцевого листка культури	25-30 + ПАР Мачо	1
Ячмінь ярий			20-25 + ПАР Мачо	1



ГЕРБІЦИДИ